


Antibiotiki: 3. del

Bojana Beovic

UKC Ljubljana

Fluorokinoloni



„generacija“	predstavnik	posebnosti protimikrobnega spektra
1	nalidiksična kislina, norfloksacin	po Gramu negativni bacili (uroantispetik)
2A	pefloksacin, ofloksacin, ciprofloksacin	po Gramu negativni bacili (ciprofloksacin: <i>P. aeruginosa</i>)
2B	levofloksacin	nekoliko bolj aktiven proti po Gramu pozitivnim kokom (pnevmokom), v višjih odmerkih učinkovit proti <i>P. aeruginosa</i>
3	moksifloksacin	boljša učinkovitost proti po Gramu pozitivnim kokom in anaerobom

Farmakokinetične in farmakodinamične lastnosti

- Ciprofloksacin, levofloksacin in moksifloksacin so v peroralni in IV obliki, zelo dobra biološka uporabnost levofloksacina in moksifloksacina
- Na biološko uporabnost vplivajo nekatere snovi, ki zmanjšujejo želodčno kislost: odmerki ob različnem času
- Prirejanje odmerkov levofloksacina in ciprofloksacina pri ledvični insuficienci
- Delovanje fq je odvisno od maksimalne koncentracije in AUC


Občutljivost tarčnih bakterij za fluorokinolone v Sloveniji 2017(%)

	ciprofloksacin	levofloksacin	moksifloksacin
<i>S. aureus</i>	91		
MRSA	27		
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	-	>99	>99
<i>Enterococcus faecialis</i>	99,5		
<i>Enterococcus faecium</i>	5,7		
<i>E. coli</i>	78,1		
<i>E. coli</i> ESBL	8,5		
<i>K. pneumoniae</i>	75,8		
<i>K. pneumoniae</i> ESBL	5,7		
<i>P. aeruginosa</i>	83,0		
<i>Acinetobacter spp.</i>	53,9		
<i>Salmonella spp.</i>	89,5		
<i>Campylobacter jejuni</i>	25,2		
<i>Neisseria gonorrhoeae</i>	57,9		


Štrumbelj I, Pirš M, Berce I, Bombek Ihan M, Fišer J, Golle A, Grmek Košnik I, Harlander T, Jeverica S, Kavčič M, Matos T, Mioč V, Mueller - Premru M, Paragi M, Piltaver Vajdec I, Ribič H, Seme K, Štorman A, Tomič V, Zdolšek B, Žolnir - Dovč M. Pregled občutljivosti bakterij za antibiotike - Slovenija 2017. Ljubljana: Slovenska komisija za ugotavljanje občutljivosti za protimikrobna zdravila (SKUOPZ); 2018. 1. izdaja. Dosegljivo na: <http://www.jmi.si/strokovna-zdruzenja/skuopz>

Občutljivost za fluorokinolone v Sloveniji, invazivni izolati, 2023

Pseudomonas aeruginosa



Escherichia coli




Klebisella pneumoniae



Protimikrobni spekter in klinična uporaba fluorokinolonov

	P. aeruginosa	Po Gramu negativne bakterije	Po Gramu pozitivne bakterije	Anaerobi
Terapevtska koncentracija lokalno		norfloksacin		
Sistemsko zdravljenje		ciprofloksacin		
		levofloksacin		
		moksifloksacin		

Protimikrobni spekter in klinična uporaba fluorokinolonov



Farmakokinetične in farmakodinamične lastnosti

- Ciprofloksacin, levofloksacin in moksifloksacin so v peroralni in IV obliki, **zelo dobra biološka uporabnost levofloksacina in moksifloksacina**
- Na biološko uporabnost vplivajo nekatere snovi, ki **zmanjšujejo želodčno kislost**: odmerki ob različnem času
- Prirejanje odmerkov **levofloksacina in ciprofloksacina pri ledvični insuficienci**
- Delovanje fq je odvisno od **maksimalne koncentracije in AUC**

Posebni stranski učinki in součinkovanja fluorokinolonov

- **epileptični krči**, še posebej sočasno z nesteroidnimi antirevmatiki ali teofilinom.
- **podaljševanje QT dobe**, zato je potrebna pazljivost pri srčnih bolnikih, še posebej tistih, ki jemljejo antiaritmike (amiodaron, prokainamid).
- **hemoliza in huda okvara jeter**.
- **Fotosenzitivnost** (levofloksacin!)
- **ruptura Ahilove tetive** (kortikosteroidi).
- **povečan učinek varfarina**
- ciprofloksacin in pefloksacin inhibirata metabolizem **teofilina**
- dajanju otrokom, nosečnicam in doječim materam se izogibamo, ker pri poskusnih živalih vplivajo na razvoj hrustanca. Prehajajo tudi v mleko.
- aplikacija dvo- in trivalentnih kationov (npr. pripravkov, ki vsebujejo kalcijeve ali železove soli, nekateri antacidi) skupaj s ciprofloksacinom, moksifloksacinom ali levofloksacinom pomembno zmanjša njune koncentracije, zato ju dajemo nekaj ur pred ali pa šele nekaj ur po jemanju teh pripravkov. Podoben vpliv imajo mlečni izdelki na ciprofloksacin, zato morajo miniti vsaj 2 uri med aplikacijo antibiotika in uživanjem take hrane.

Evropska agencija za zdravila 2018:

Fluoroquinoloni so povezani s prolongiranimi (lahko več mesecev trajajočimi) resnimi, onesposobljujočimi in potencialno ireverzibilnimi neželenimi učinki, ki prizadenejo predvsem gibala in živčevje.

Flurokinolonov naj zato ne uporabljamo pri:

- zdravljenju okužb, ki se pozdravijo spontano (vneto žrelo)
- zdravljenju vnetij, ki niso bakterijske etiologije (npr kronični nebakterijski prostatitis)
- preprečevanju popotniške driske ali okužb spodnjih sečil
- zdravljenju blagih do zmerno hudih okužb razen, če ni možno uporabiti drugih zdravil

<https://www.ema.europa.eu/en/news/disabling-potentially-permanent-side-effects-lead-suspension-restrictions-quinolone-fluoroquinolone>




FDA warns about increased risk of ruptures or tears in the aorta blood vessel with fluoroquinolone antibiotics in certain patients

FDA Drug Safety Communication

- FDA opozarja na možnost disekcije aorte zaradi jemanja fluorokinolonov pri določenih bolnikih: bolniki z zaporo ali anevrizmo aorte, povišanim krvnim tlakom, z določenimi genetskimi motnjami in starostniki
- FDA opozarja na možnost resne hipoglikemije ob fluorokinolonskih antibiotikih
- FDA ponovno opozarja na onesposobljujoče varnostne zaplete zdravljenja s fluorokinoloni

Metronidazol



Farmakokinetika

- dobra peroralna absorpcija
- dobro prehaja v vsa tkiva, tudi osrednje živčevje in v abscese,
- metabolizem pa poteka v jetrih

Protimikrobni spekter

- po Gramu negativne in nekatere po Gramu pozitivne anaerobne bakterije
- zajedavci: *Entamoeba histolytica*, *Giardia lamblia*, *Trichomonas vaginalis*

Antibiotiki, ki delujejo proti črevesnim anaerobom

- Težave pri iskanju najnovejših poročil o občutljivosti, majhno število izolatov v številnih centrih zmanjšuje zanesljivost podatkov.
- Zmanjšanje občutljivosti za amoksi-klav: kaj to pomeni za piperacilin-tazobaktam?
- Metronidazol ostaja najbolj zanesljiv antibiotik.
- Dobra dovzetnost za karbapeneme.
- Dovzetnost za klindamicin je prenizka za empirično zdravljenje.

Susceptibility (%)	co-amoxiclav		imipenem		clindamycin		metronidazole	
	SI (2015)	ES (2018-19)	SI	ES	SI	ES	SI	ES
Bacteroides spp.	92	51-71	99	92-95	73	48-59	100	97-98
Prevotella spp.	100	100	100	100	64	65	100	95
Clostridium spp.	99	63-95	99	78-100	82	84-89	100	90-100

Seifert H, et al. J Antimicrob Chemother 2010;65(11):2405-10., Jeverica S, et al. Anaerobe (2017), doi:10.1016/j.anaerobe.2017.04.007., López-Pintor JM, et al. Anaerobe (2021), doi: <https://doi.org/10.1016/j.anaerobe.2021.102446>.


Klinična uporaba metronidazola

- skupaj z aminoglikozidnimi ali betalaktamskimi antibiotiki za zdravljenje in preprečevanje (ob kirurškem posegu) mešanih okužb v trebušni votlini,
- zdravljenje blagih do zmernih okužb, ki jo povzroča *C. difficile*
- skupaj z drugimi antibiotiki za zdravljenje okužb s *H. pylori*
- zdravljenje bakterijske vaginoze
- nekatere druge okužb z zajedavci.

Stranski učinki metronidazola

- kovinski okus v ustih
- nevropatija, ki se lahko pojavi po večkratnih kratkotrajnih terapijah, opisani pa so tudi primeri psihoze
- če ob jemanju metronidazola uživamo alkohol, se pojavi disulfiramski učinek

Kloramfenikol



Farmakokinetika

- Zelo dobra absorpcija peroralno in *per rectum*, tudi iv, mazila, kapljice...
- Dobro prehajanje prav v vsa tkiva

Protimikrobni spekter

- izredno širok
- med grampozitivnimi koki ne deluje le na enterokoke in stafilokoke, zelo je učinkovit tudi proti gramnegativnim bacilom.
- rikecije, klamidiije in mikoplazme

Klinična uporaba kloramfenikola

- klinična raba kloramfenikola je omejena zaradi hudih stranskih učinkov.
- okužbe osrednjega živčevja (gnojni meningitis, absces) pri bolnikih, ki so preobčutljivi na druge antibiotike
- zdravljenje rikeciz pri bolnikih, ki so preobčutljivi na druge antibiotike
- v deželah tretjega sveta ga še vedno uporabljajo pogostejše, saj omogoča enostavno peroralno ali celo rektalno zdravljenje hudih okužb, npr. gnojnega meningitisa pri otrocih.

Stranski učinki kloramfenikola

- aplazija kostnega mozga
 - od odmerka odvisna zavora, ki je pogosta in reverzibilna po ukinitvi zdravila
 - idiosinkrastična oblika: gre za ireverzibilno aplastično anemijo, ki se lahko pojavi še mesece po koncu zdravljenja in po kateremkoli načinu aplikacije zdravila, tudi po kapljicah za oči, čeprav je najpogostejša po peroralnem zdravljenju. Smrtnost je velika, pri tistih, ki okrevajo pa se v večjem številu pojavlja akutna levkemija.
- sindrom sivega otroka. Smrtnost je 40%. Podoben učinek so opazili pri odraslih, ki so prejeli previsoke odmerke kloramfenikola.

Rifampicin

- **Farmakokinetika**
- Dobra peroralna absorpcija, parenteralna oblika na voljo le izjemoma
- Izločanje v žolč, nato zapade enterohepatični cirkulaciji (iz črevesa se ponovno absorbira, nato ponovno izloči).
- **Protimikrobni spekter**
- Rifampicin je zelo širokospektralen antibiotik.
- Po Gramu pozitivne bakterije: stafilokoki, streptokoki, nekoliko manj enterokoki, *Bacillus* spp, listerija, nokardija, klostridiji.
- Po Gramu negativna bakterije: neiserije, *H. influenzae*, enterobakterije razen samonel in šigel, tudi *P. aeruginosa* je odporen.
- legionele, *H. pylori* in bartonele.
- različne vrste mikobakterij,
- rikecije, klamidije in anaplazme, neglerije, lišmenije in plazmodije.
- **Slovenija 2013:** 3% MRSA S, drugi *S. aureus* občutljivi, prav tako *M. tuberculosis*

Štrumbelj I, et al. SKUOPSZ

Klinična uporaba rifampicina

Rifampicin navadno uporabljamo v kombinaciji z drugimi zdravili, deloma zaradi **sinergističnega** učinka, ki ni vedno dobro dokazan, predvsem pa zaradi hitrega razvoja odpornosti, če uporabljamo rifampicin kot monoterapijo

KOMBINACIJE

- **tuberkuloza** in okužbe z nekaterimi drugimi mikobakterijami (z izoniazidom, pirazinamidom, etambutolom in drugimi protituberkuloznimi zdravili)
- **lepra** (z dapsonom in klofaziminom)
- hude stafilokokne okužbe (z vankomicinom in gentamicinom ali s ciprofloksacinom- **okužbe vsadkov**– prehajanje v biofilm, vpliv na bakterije v stacionarni fazi)
- **bruceloza** (s tetraciklini, streptomycinom in/ali trimetoprimom s sulfometoksazolom)

MONOTERAPIJA

- **preprečevanje meningitisa**, ki ga povzročata *H. influenzae* in *N. meningitidis*



Součinkovanja in stranski učinki rifampicina

- hepatotoksičnost, zato je treba spremljati aktivnost jetrnih encimov med terapijo
- oranžno obarvanje tekočin, tudi solzne tekočine (kontaktnih leč!)
- indukcija jetrnih mikrosomalni encimov, kar povzroča zmanjšanje učinka varfarina, hormonskih kontraceptivov in glukokortikoidov in drugih zdravil, ki se metabolizirajo v jetrih s pomočjo družine encimov CYP 450 **zelo težavno**
- gripi podobno stanje

Sulfonamidi in trimetoprim

- Trimetoprim in sulfametoksazol zavirata dve zaporedni mest v sintezi folne kisline
- Najbolj učinkovito je masno razmerje 5:1 = 400 mg SMX + 80 mg TMP

Trimethoprim
 $C_{14}H_{18}N_4O_3$



Farmakokinetika TMP-SMX

- Dobra peroralna absorpcija
- Visoke koncentracije v seču
- Dobro prehajanje v OŽS
- Presnova poteka v jetrih z acilacijo

Protimikrobni spekter TMP-SMX

- sulfametoksazol v kombinaciji s trimetoprimom ali samostojno deluje na številne po Gramu pozitivne in negativne mikroorganizme, mnogi pa so v dolгих letih uporabe zdravila postali nanj odporni.
- *Nocardia asteroides*, *Pneumocystis jirovecii*, *Listeria monocytogenes*

Občutljivost izolatov iz seča bolnic z nezapletenim cistitisom v Sloveniji (2)!

Table 3: Antimicrobial susceptibility and resistance of *E. coli* isolates from urine samples in women with acute uncomplicated cystitis.

Antibiotic	No. of tested <i>E. coli</i> isolates	Proportion of <i>E. coli</i> isolates susceptible to the antibiotic %	Proportion of <i>E. coli</i> isolates resistant to the antibiotic
trimethoprim/sulfamethoxazole	62	85.5	14.5
nitrofurantoin	62	98.4	1.6
fosfomycin trometamol	58	100	0
norfloxacin	53	98.1	1.9
ciprofloxacin	62	98.4	1.6
ampicillin (and amoxicillin)*	62	72.6	27.4
amoxicillin with clavulanic acid – interpretation for uncomplicated cystitis	62	98.4	1.6
amoxicillin with clavulanic acid – interpretation for systemic infections	62	95.2	4.8
cefadroxil	58	100	0
cefuroxime axetil	62	100	0
cefixime	58	100	0


Klinična uporaba TMP-SMX

- **TMP** samostojno uporabljamo predvsem za zdravljenje **okužb sečil**.
- TMP-SMX lahko uporabljamo za zdravljenje številnih pogostih okužb, če so povzročitelji za kombinacijo občutljivi, **najpogosteje za zdravljenje okužb sečil**.
- v okoljih, v katerih je *Escherichia coli*, najpogostejši povzročitelj okužb sečil, vsaj v 80% za kombinacijo ali za TMP občutljiva, sta tako kombinacija ali TMP sam (odvisno od razpoložljivosti na trgu) zdravilo izbire za izkustveno zdravljenje okužb sečil.
- zdravljenje okužb z zgoraj omenjenimi **redkimi** povzročitelji (nokardija, listeria, pneumocista)

Stranski učinki TMP-SMX

- kristalurija, tubulna nekroza (slaba topnost)
- hematološke motnje: purpura, koagulacijske motnje, hemolitična anemija, ki se pojavi predvsem pri pomanjkanju glukoza-6-fosfat dehidrogenaze
- slabost, bruhanje, prehodna zlatenica
- depresija, in halucinacije
- povečan učinek varfarina
- izpuščaj, nevtropenija, Stevens-Johnson sindrom, Sweet sindrom in pljučni infiltrati (posebno pri bolnikih z AIDS).
- pri novorojenčkih, še posebej nedonošenih možen kernikterus

Nitrofurantoin



Farmakokinetika.

- absorpcija nitrofurantoina iz prebavil je zadovoljiva in se zveča, če ga jemljemo s hrano
- v serumu ne dosega terapevtskih koncentracij.

Protimikrobni spekter

- *E. coli*, *Citrobacter spp.*, stafilokoki in enterokoki, tudi VRE.
- Občutljivost bakterije *Klebsiella spp.* in *Enterobacter spp.* je slabša.
- *Proteus spp.*, *Providentia spp.*, *Serratia spp.* in *Morganella spp.* so redko občutljive za nitrofurantoin.

Občutljivost izolatov iz seča bolnic z nezapletenim cistitisom v Sloveniji (2)!

Table 3: Antimicrobial susceptibility and resistance of *E. coli* isolates from urine samples in women with acute uncomplicated cystitis.

Antibiotic	No. of tested <i>E. coli</i> isolates	Proportion of <i>E. coli</i> isolates susceptible to the antibiotic %	Proportion of <i>E. coli</i> isolates resistant to the antibiotic
trimethoprim/sulfamethoxazole	62	85.5	14.5
nitrofurantoin	62	98.4	1.6
fosfomycin trometamol	58	100	0
norfloxacin	53	98.1	1.9
ciprofloxacin	62	98.4	1.6
ampicillin (and amoxicillin)*	62	72.6	27.4
amoxicillin with clavulanic acid – interpretation for uncomplicated cystitis	62	98.4	1.6
amoxicillin with clavulanic acid – interpretation for systemic infections	62	95.2	4.8
cefadroxil	58	100	0
cefuroxime axetil	62	100	0
cefixime	58	100	0

Klinična uporaba in stranski učinki nitrofurantoina

zdravilo izbire za nezapleteni cistitis
preprečevanje okužb (spodnjih) sečil pri otrocih in odraslih.

Stranski učinki

- najpogostejše so prebavne motnje
- okvara jeter
- periferna nevropatija
- preobčutljivostna reakcija pljuč, ki je v kronični obliki lahko ireverzibilna
- hemolitična anemija, ki se pojavi predvsem pri pomanjkanju glukoza-6-fosfat dehidrogenaze

**Katero zdravilo najpogosteje predpišete za zdravljenje
nezapletenega cistitisa pri ženski
(interaktivno vprašanje)**

1. TMP-SMX
2. ciprofloksacin
3. levofloksacin
4. norfloksacin
5. nitrofurantoin

Fosfomicin

- Fosfonski antibiotik
- Zelo širok protimikrobni spekter, nekoliko slabše delovanje proti *Pseudomonas aeruginosa*
- Dobra porazdelitev v vsa tkiva, tudi v cerebrospinalni likvor
- Neželeni učinki niso pogosti

Raz R. Clin Microbiol Infect 2012; 18: 4–7.

Fosfomicin: indikacije

- **Nezapletene okužbe sečil pri ženskah: en odmerek 3g!**
- Opisano je zdravljenje vnetja srčnih zaklopk, pljučnice, pljučnih abscesov, okužb pri bolnikih s cistično fibrozo, osteitisa in okužb mehkih tkiv
- In vitro deluje sinergistično z več antibiotiki, klinično sinergizem ni prepričljivo dokazan

Raz R. Clin Microbiol Infect 2012; 18: 4–7., Wagelehner RME, et al. Urologe. 2011; 50: 153–69.,

Gupta K, et al. Clin Infect Dis 2011; 52: 103–120.

Pivmecilinam

- Predzdravilo, po absorpciji nastane učinkovina mecilinam
- Soroden betalaktamom, a z drugačnim načinom delovanja
- Predvsem deluje na enterobakterije, klinična učinkovitost proti *Staphylococcus saprophyticus*, pogostim povzročiteljem cistitisa, je posledica velike koncentracije v seču
- Deluje na bakterije, ki izločajo ESBL (predvsem CTX-M)
- Uporablja se za zdravljenje akutnega cistitisa pri otrocih in odraslih, v Skandinaviji predstavlja 30% antibiotikov za to področje
- Ugoden varnostni profil in počasen razvoj odpornosti

Fusidna kislina

- **tetraciklični triterpenoid, ki ga izločajo nekateri dermatofiti in zavira elongacijo beljakovinske molekule**
- **deluje na po Gramu pozitivne mikroorganizme, posebej *S. aureus*, tudi MRSA, betahemolitični streptokoki so iz neznanega razloga za fusidno kislino slabše občutljivi.**
- **mazila, tablete, kapsule, suspenzije, parenteralna oblika**
- **opisana uporaba za zdravljenje stafilokoknih okužb kože in mehkih tkiv, osteomielitisa, topično v oftalmologiji**
- **med neželenimi učinki izstopajo prebavne motnje, opisana je odpoved jeter**


Golledge C. Int J Antimicrob Agents 1999; 12: S11-5.

Kraus CN, et al. Clin Infect Dis 2011; 52: Suppl 7: 527-37.

Polimiksini

Farmakokinetika.

- Polimiksini se zelo slabo absorbirajo po peroralni aplikaciji. Izločajo se skozi ledvice,



Protimikrobni spekter.

- po Gramu negativne bakterije: enterobakterije vključno s salmonelami in šigelami ter *Acinetobacter spp.* in *P. aeruginosa*.

Klinična uporaba

- Klinično uporabljamo v zadnjem času predvsem kolistin za okužbe z večkrano odpornimi sevi *P. aeruginosa* in *Acinetobacter spp.* Možna je tudi topična uporaba za spiranje sečnega mehurja, za sterilizacijo črevesa in v obliki inhalacij.
- v južni Evropi uporabljajo kolistin pogosteje zaradi odpornosti bakterij proti vsem drugim antibiotikom, zato so se pojavili še proti kolistinu odporni sevi.

Stranski učinki.

- nefrotoksičnost, zato se le redko uporabljajo sistemsko
- nevrološki stranski učinke npr. mišična šibkost, apnea, parestezije, vrtoglavica in nerazločen govor.

Kolistin

- Polimiksin E
- Deluje le na po Gramu negativne bakterije
- Dajemo ga parenteralno in topično, per os se ne absorbira
- Ne prehaja v cerebrospinalni likvor
- Okvarja ledvice in živčevje, v novejših poročilih manj neželenih učinkov

Nation RL, Li J. Polymyxins. V: Grayson ML, Crowe SM, McCarthy JS, Mills J, Mouton JW, Norrby SR. Kucers' the use of antibiotics. London: Hodder Arnold; 2010. p. 955-70. Hartzell JD, Neff R, Ake J, Howard R, Olson S, Paolino K, et al. Nephrotoxicity associated with intravenous colistin (colistimethate sodium) treatment at a tertiary care medical center. Clin Infect Dis 2009; 48: 1724-8., Nation RL, Li J. Polymyxins. V: Grayson ML, Crowe SM, McCarthy JS, Mills J, Mouton JW, Norrby SR. Kucers' the use of antibiotics. London: Hodder Arnold; 2010. p. 955-70.

Oblike kolistina in odmerki

- Parenteralno uporabljamo kolistin metan sulfonat (CMS) = **kolistimetat**
- Kolistimetat se v telesu pretvori v aktivni kolistin
- 400 mg = 5×10^6 CMS $\sim$ 150 mg “colistin base activity” (**CBA**)
- Glede na MIK tarčnih mikroorganizmov in izmerjene koncentracije v serumu bolnikov priporočajo odmerjanje, ki je večje od registriranih odmerkov
- Pri odraslih bolnikih z normalno ledvično funkcijo:
 - polnitveni odmerek 9-12 Mio IE
 - vzdrževalni odmerek 12 Mio IE: 2-3

Garonzik SM, et al. Antimicrob Agents Chemother 2011; 55: 3284-94. , Plachouras D, et al. Antimicrob Agents Chemother 2009; 52: 3430-6.
Nation RL, et al. Clin Infect Dis 2017;64(5):565–71

International Consensus Guidelines for the Optimal Use of the Polymyxins:
 Endorsed by the American College of Clinical Pharmacy (ACCP), European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID), Infectious Diseases Society of America (IDSA), International Society for Anti-infective Pharmacology (ISAP), Society of Critical Care Medicine (SCCM), and Society of Infectious Diseases Pharmacists (SIDP)[†]

Pharmacotherapy 2019;39(1):10–39

Table 2. Look-up Table of Daily Doses of CMS^a

Creatinine clearance, mL/ minute ^b	Daily dose of CMS for plasma colistin $C_{ss,avg}$ of 2 mg/L ^c	
	mg CBA/ day	Million IU/ day
0	130	3.95
5 to < 10	145	4.40
10 to < 20	160	4.85
20 to < 30	175	5.30
30 to < 40	195	5.90
40 to < 50	220	6.65
50 to < 60	245	7.40
60 to < 70	275	8.35
70 to < 80	300	9.00
80 to < 90	340	10.3
≥ 90	360	10.9

CBA = colistin base activity; CMS = colistin methanesulfonate; $C_{ss,avg}$ = average steady-state plasma concentration;

^aTo achieve a desired target plasma colistin $C_{ss,avg}$ of 2 mg/L for patients with narrow windows of creatinine clearance. Reproduced from reference 6 with minor modifications.

^bAdjusted body weight should be used to estimate creatinine clearance.

^cDaily dose administered in two divided doses 12 hours apart.

Klinična učinkovitost kolistina

- majhne, pretežno opazovalne raziskave, uspešnost zdravljenja cca 75%
- pljučnica, okužbe rane, okužbe sečil, okužbe v trebušni votlini, okužbe osrednjega živčevja, bakteriemija in okužbe kosti
- skoraj v vseh primerih je šlo za okužbo z zelo odpornimi sevi *P. aeruginosa* ali *Acinetobacter spp.*
- praviloma uporaba v kombinacijah!

Reina R, Estenssoro E, Saenz G, Canales HS, Gonzalvo R, Vidal G, et al. Safety and efficacy of colistin in Acinetobacter and Pseudomonas infections: a prospective cohort study. Intensive Care Med 2005; 31:1058-65.

Malo ponovimo:

(interaktivno vprašanje)

- Na bakterijo *P. aeruginosa* delujeta med peroralnimi antibiotiki:

- a) ciprofloksacin
- b) moksifloksacin
- c) levofloksacin
- d) cefiksim

- 1. a, c
- 2. a, b
- 3. a, d

Na bakterije, ki izločajo ESBL, delujejo

(interaktivno vprašanje)

- a. ertapenem
- b. temocilin
- c. piperacilin/tazobaktam
- d. fosfomicin
- e. cefotaksim

- 1. a,b,c,d
- 2. a,c,e
- 3. a,b,e